

MINUTA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 2017
"JUNTOS POR ELLAS"
JUEVES 10 DE AGOSTO – COLEGIO POETA VICENTE HUIDOBRO – MILTON ROSSEL 7191,
LO PRADO

I.- VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO:

- El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el mayor causante del cáncer de cuello de útero. En Chile este cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años), causando más de 600 muertes al año.
- **Hasta el año 2013, la vacuna contra el VPH la podían adquirir sólo quienes pudieran costearla. Desde el año 2014, y como parte de una política pública del Gobierno de la Presidenta Bachelet, se garantizó en Chile que todas las niñas pudieran acceder a ella en forma gratuita, dando un nuevo paso en equidad en Salud.**
- La aparición del cáncer de cuello uterino es más frecuente entre los 35 a 55 años. Debido a que el tiempo entre la infección por VPH y el desarrollo del cáncer es de 20 años en promedio, las personas con más riesgo de infectarse son los adolescentes y menores de 25 años. Por ello, se recomienda la vacunación a la edad más temprana posible.
- La vacuna requiere de dos dosis, con un intervalo de tiempo de 1 año entre la primera y segunda dosis.
- Con el objetivo de proteger a todas las niñas que egresaran de la educación básica contra el Virus del Papiloma Humano, el año 2015 se ejecutó una campaña de puesta al día y se vacunó con una primera dosis a las niñas que cursaban 6° básico (11 años) y 7° básico (12 años), finalizando la estrategia el año 2016, donde se administró una segunda dosis en 7° y 8° año básico.

AÑO	4° BÁSICO	5° BÁSICO	6° BÁSICO	7° BÁSICO	8° BÁSICO
2014	X				
2015	X	X	X	X	
2016	X	X		X	X
2017	X	X			

- **La vacuna utilizada es segura y efectiva, a la luz de la evidencia de millones de dosis administradas en el mundo.** Los estudios indican que los efectos adversos de la vacuna no son diferentes a los que pueden ocurrir con otras vacunas (dolor, inflamación en el sitio de la inyección, y raramente, sensación de fatiga que puede llegar al desmayo). Esto último se asocia más a la situación de ansiedad y temor que provoca cualquier vacunación con productos inyectables que a la acción de la vacuna misma.

- Desde el año 2014 a la fecha se han aplicado más de 855.000 dosis de vacunas en el país en este grupo objetivo.
- La vacuna que se administrará este año es la GARDASIL, la misma que se ha utilizado desde el año 2014.
- GARDASIL está aprobada para su uso en 132 países.
- Las principales organizaciones de Salud en todo el mundo, incluyendo la OMS, los CDC, Health Canada, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Australia Therapeutic Goods Administration (TGA), entre otros, recomiendan el uso rutinario de vacunas contra el VPH.

II.- VACUNACIÓN 2017:

La población escolar a vacunar en 2017 es de 234.872 niñas.

4to básico: 118.355

5to básico: 116.517

El año 2016 se administró según calendario de vacunación 334.316 dosis (primera dosis en 4to básico y segunda dosis en 5to, 7mo y 8vo).

Las coberturas alcanzadas durante el 2016 son las siguientes:

2016			
4º básico 1º dosis	5º básico 2º dosis	7º básico 2º dosis	8º básico 2º dosis
77%	73%	70%	67%

III.- ANTECEDENTES VIRUS PAPILOMA HUMANO:

- El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus común, con más de 40 tipos que infectan las mucosas de las personas, siendo la mayoría de las infecciones asintomáticas y pasajeras. Algunos de los tipos cancerígenos de este virus pueden persistir y causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres menos frecuentes, como los de ano, pene, vulva, vagina y cavidad bucofaríngea. Otros tipos no cancerígenos pueden causar verrugas genitales y verrugas en las vías respiratorias de los niños (papilomatosis respiratoria).
- El VPH se transmite a través del contacto genital (mucosas y piel), la transmisión no requiere de relación coital, por lo que puede producirse también por la práctica de caricias o contacto de piel con las mucosas del área genital. El VPH también se puede contraer durante el sexo oral. Debido a que la infección muchas veces no produce síntomas, la mayoría de las personas ni siquiera sabe que tiene VPH o que lo está transmitiendo.
- La vacuna contra el VPH que se utiliza en Chile se dirige específicamente a los subtipos 16 y 18, que causan no sólo aproximadamente 70% de los cánceres de cuello uterino, sino que también causan cáncer anal (95% relacionado con HPV),

vulvar (50% vinculado), vaginal (65% vinculado), y orofaríngeo (60% relacionado). También se centra en HPV6 y HPV11, que representan aproximadamente el 90% de las verrugas genitales externas.