



INDICACIONES PARA TAC CON MEDIO DE CONTRASTE IODADO I.V.

Estimado Usuario,

Para lograr el mejor rendimiento de su prestación, le indicamos que previo a su examen debe seguir la siguiente preparación:

- Pacientes usuarios de metformina deben suspender su medicamento 48 hrs antes del examen (2 días antes), **solo si profesional que lo encuesta se lo indica.** Ante la duda **CONSULTAR.**

Día antes del examen (24 hrs)

- Ingerir abundante líquido. (agua y jugos sin gas, sopas sin residuos)

Día del examen:

- Presentarse en Ayunas (2 hrs previas al examen).
- Beber 1 litro de agua una hora antes del examen. Pacientes con incontinencia urinaria beber litro de agua 20 minutos antes del examen

Posterior al examen:

- Ingerir abundante líquido.
- Pacientes usuarios de metformina, pueden volver a tomar su medicamento 48 hrs después del examen (2 días después), si corresponde.



INDICACIONES PARA TAC CON MEDIO DE CONTRASTE IODADO I.V.

Estimado Usuario,

Para lograr el mejor rendimiento de su prestación, le indicamos que previo a su examen debe seguir la siguiente preparación:

- Pacientes usuarios de metformina deben suspender su medicamento 48 hrs antes del examen (2 días antes), **solo si profesional que lo encuesta se lo indica.** Ante la duda **CONSULTAR.**

Día antes del examen (24 hrs)

- Ingerir abundante líquido. (agua y jugos sin gas, sopas sin residuos)

Día del examen:

- Presentarse en Ayunas (2 hrs previas al examen).
- Beber 1 litro de agua una hora antes del examen. Pacientes con incontinencia urinaria beber litro de agua 20 minutos antes del examen

Posterior al examen:

- Ingerir abundante líquido.
- Pacientes usuarios de metformina, pueden volver a tomar su medicamento 48 hrs después del examen (2 días después), si corresponde.